

Приучение щенков к корму.

С 3-4 недели можно начинать прикорм щенков кормами в жидкой или кашцеобразной форме. В более раннем периоде можно практиковать докорм щенков заменителями молока, что оправдано при больших пометах, которые не могут нормально расти без дополнительного прикорма. Причиной недостаточного набора веса может быть конкуренция щенков и оттеснение более слабых. В этом случае щенков с недостаточным весом необходимо докармливать.

С 3 недели можно начинать прикорм. **Кормовая смесь** должна быть свежей и **подогретой до температуры тела (38-39⁰С)**. Поначалу щенки, как правило, обращают мало внимания на корм, потому что основное поступление питательных веществ происходит с молоком. Обычно один щенок начинает есть корм, остальные следуют его примеру.

Если щенки игнорируют корм, их следует мягко стараться привлечь к нему – аккуратно приблизив корм к носу или внося пальцем небольшое его количество в рот. Принудительные меры исключены.

Прикорм полноценным кормом для щенков. При переводе щенков с 3-4 недели на полутвердый корм, рекомендуется выбрать достаточно энергоемкий корм (специализированный для щенков: Mini Baby & Junior для мелких пород, Medium Baby для средних и Maxi Baby для крупных) и добавлением воды превращать его в густую кашу. Влажный корм для щенков (консервы) разводят с водой в соотношении 1:1, сухой требует добавления трехкратного количества воды. Вода для размачивания сухого корма должна быть температуры примерно 50 градусов, тогда размочивание корма будет занимать минут 15-20. Если вода будет холоднее, корм будет размочать дольше. **Корм должен быть комнатной температуры.** Если мешок в зимний период находится на балконе (или в холодном помещении), корм может размочать дольше, что уже нарушает условия использования корма.

При таком кормлении не требуется добавок. Со 2-3 недели с начала прикорма щенки начинают поедать кашу с аппетитом. **При реакции в виде изменения консистенции стула, рвоты или поноса прикорм прекращают на полдня-день или снижают его количество.** Переход на неразмоченный корм возможен самое раннее с 5-6 недели жизни. При этом необходимо обеспечить животных достаточным количеством свежей воды.

Количество корма подбирают в соответствии с аппетитом щенков. По причине различного количества молока у сук невозможно указать четкие количества. Количество корма должно быть таким, какое съедается щенками без остатка. Если щенки не доели корм, в следующее кормление следует готовить меньшее количество.

Прикорм щенков следует проводить отдельно от матери, чтобы они могли есть без помех. Пока щенки находятся при матери, достаточно 3-кратных кормлений с 8-10-часовым ночным интервалом. Корм следует предлагать щенкам на плоской тарелке. Всю посуду необходимо тщательно очищать после каждого кормления.

Отъем щенков можно проводить с 6 недели, как правило, он оканчивается к 8 неделе. Отъем производят, только когда щенки начинают поедать **достаточное количество (суточную норму)** корма.