

<p><u>Частая рвота</u> <u>Отрыжка</u> <u>Рвота натощак</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Слишком быстрое поедание</li> <li>- Соперничество</li> <li>- Стресс</li> <li>- Воспаление слизистой оболочки желудка</li> <li>- Инфекции ЖКТ</li> <li>- Заболевания печени/почек</li> <li>- Нарушение моторики (нарушение деятельности ЖКТ)</li> <li>- Неправильное строение (например, пищевода =&gt; «ложная рвота»)</li> <li>- Непроходимость кишечника, инородные тела</li> <li>- Редко: отравления, опухолевые заболевания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- При соперничестве: кормить собак отдельно</li> <li>- Сухой корм размачивать теплой водой (40°C) в течение 15 минут</li> <li>- Лучше кормить два раза в день! При рвоте натощак и частом срыгивании: разделить суточную норму на несколько мелких кормлений, давать немного корма утром сразу после сна и перед сном</li> <li>- Очень чувствительных собак перевести на полноценные хлопья</li> <li>- Улучшить условия содержания (устранить стресс)</li> <li>- Исследования крови дают сведения о функциях печени и почек</li> <li>- Нарушения моторики, строения, опухоли и кишечная непроходимость определяются чаще всего только рентгенологически</li> <li>- При острой сильной рвоте обязательно проконсультироваться у врача!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Диета «Чувствительное пищеварение»</b> <b>HAPPY DOG Supreme</b> – в зависимости от возраста и нагрузок</li> <li>- <b>Классик</b> полноценные хлопья</li> <li>- При сильной и средней степени выраженности функциональных заболеваний печени с нарушением усвоения жира: <b>FIT&amp;WELL Light</b></li> <li>- При легкой и средней степени функциональных заболеваний почек: <b>Диета «Почки»</b> (Для получения среднего содержания протеина и жира можно смешивать FIT&amp;WELL Light и Диету «Почки» (1:1))</li> </ul>
--	---	---	--

<p>Частый понос, метеоризм</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Слишком быстрая смена корма</li> <li>- неподходящий корм</li> <li>- Слишком большая суточная норма</li> <li>- Слабое пищеварение (недостаточность поджелудочной железы)</li> <li>- Инфекции ЖКТ</li> <li>- Паразиты (глисты, простейшие)</li> <li>- Заболевания печени и почек</li> <li>- Стресс</li> <li>- Редко: отравления, опухолевые заболевания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевод на новый корм, особенно чувствительных животных, необходимо проводить за несколько дней (около недели), при этом новый корм смешивают со старым, постоянно увеличивая количество нового и уменьшая количество старого</li> <li>- Чувствительным собакам не применять корма с грубой структурой (в виде мюсли) и при определении суточной нормы выбирать меньшее количество, которое постепенно следует повышать</li> <li>- Лучше кормить два раза в день</li> <li>- Особенно щенков следует кормить мелкими порциями (пищеварительные ферменты начинают нормально выделяться только с 12 недель)</li> <li>- При подозрении на заболевание поджелудочной железы/паразитов/инфекции ЖКТ/заболевания печени/почек требуется консультация у ветеринарного врача</li> <li>- Улучшить условия содержания</li> </ul> <p>При острой сильной рвоте обязательно проконсультироваться у врача!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Диета «Чувствительное пищеварение», HAPPY DOG FIT&amp;WELL ADULT Mini/Medium/Maxi Или Supreme Новая Зеландия</b> (перед скармливанием для повышения усвоения размочить водой)</li> <li>- <b>Классик</b> полноценные хлопья - при легкой и средней степени выраженности функциональных заболеваний печени с нарушением усвоения жира: <b>FIT&amp;WELL Light</b></li> <li>- При легкой и средней степени заболеваний почек: <b>Диета «Почки»</b> (Для получения среднего содержания протеина и жира можно смешивать FIT&amp;WELL Light и Диету «Почки» (1:1)</li> <li>- <b>NaturCroq Ягненок и рис.</b></li> </ul>
--------------------------------	---	--	--

<p><u>Недостаточность поджелудочной железы</u> (слабое пищеварение вследствие недостатка ферментов)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Врожденный порок формирования поджелудочной железы</li> <li>- Приобретенные нарушения (после воспаления поджелудочной железы, редко: опухоли)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вследствие недостатка пищеварительных ферментов требуется переход на особенно легкоусвояемый и доступный корм (не использовать мюсли и грубые корма)</li> <li>- Перед скармливанием размочить гранулы</li> <li>- Альтернатива – корм с высоким содержанием легкоусвояемых хлопьев</li> <li>- Кормить несколько раз в день!</li> <li>- При сильных нарушениях возможна дополнительная дача ферментов поджелудочной железы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Диета «Чувствительное пищеварение», HAPPY DOG FIT&amp;WELL ADULT Mini/Medium/Maxi или Supreme Новая Зеландия</b> (перед скармливанием для повышения усвоения размочить водой)</li> <li>- <b>Классик</b> полноценные хлопья</li> </ul>
---	---	--	---